



**Gevoeligheid voor Bacterievuur (*Erwinia amylovora*)**  
**Globaal overzicht van de belangrijkste varëteiten van hoogstam- en laagstamperen**  
**in België**

M. LATEUR  
 Dépt. Lutte Biologique & Ressources Génétiques  
 CRA-W Gembloux

<u>Variëteit en land van oorsprong</u>	<u>synoniem</u>	<u>oogst en rijpheid</u>	<u>bloei</u>	<u>Gevoeligheid voor Bacterievuur</u> (bloemen en twijgen)
RGF= variëtés anciennes diffusées par le CRA-W GEMBLOUX		7=juli; 8=augustus;...	1=extreem vroeg;...4=gemiddeld;...9=extreem laat	1=heel weinig gevoelig; 2= weinig gevoelig; 3=gemiddeld gevoelig; 4=zeer gevoelig; 5=extreem gevoelig
<b>Beurré Alexandre Lucas (F, 1870)</b>		<b>m10-01</b>	<b>1 à 2</b>	<b>1</b>
<b>Ananas de Courtrai (B, 1784)</b>		<b>f08-09</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
<b>Beurré Chaboceau (B, ~1790)</b>	<b>Jefkespeer</b>	<b>f09-10</b>	<b>4 à 5</b>	<b>2</b>
<b>Beurré Hardy (F, 1820)</b>		<b>f09-10</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
<b>Beurré Lebrun (F, 1856)</b>		<b>m09-10</b>	<b>3 à 4</b>	<b>2</b>
<b>Bon Chrétien Williams (UK, 1770)</b>		<b>f08-09</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
<b>Calebasse à la Reine (B, 1770)</b>		<b>f08-09</b>	<b>4 à 5</b>	<b>2</b>
<b>Comtesse de Paris (F, 1884)</b>		<b>m10-02</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>Doyenné Boussoch (B, 1800)</b>	<b>Double Philippe; Beurré de Mérode</b>	<b>m09-10</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
<b>Duchesse d'Angoulême (F, 1840)</b>		<b>d10-11</b>	<b>3 à 4</b>	<b>2</b>
<b>Jules d'Airoles (F ou B, 1836)</b>		<b>m10-12</b>	<b>6</b>	<b>2</b>
<b>Nec Plus Meuris (B, 1822)</b>	<b>Beurré d'Anjou falso</b>	<b>d10-12</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

<b>Précoce Henin</b> <sup>RGF</sup> (B, ~1970 )		<b>m08</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
<b>Saint-Mathieu</b> <sup>RGF-CRRG</sup> (B/F, très ancienne)		<b>f09-11</b>	<b>5</b>	<b>2</b>
<b>Saint-Rémy</b> (B, ~1850)		<b>m10-03</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
<b>Beurré de Naghin</b> (B, 1840)		<b>m10-12</b>	<b>3 à 4</b>	<b>3</b>
<b>Beurré d'Hardenpont</b> (B, 1759)		<b>m10-01</b>	<b>4 à 5</b>	<b>3</b>
<b>Conférence</b> (UK, 1884)		<b>m09-11</b>	<b>4 à 5</b>	<b>3</b>
<b>Joséphine de Malines</b> (B, 1830)		<b>f10-01</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
<b>Légipont</b> (B, ~1800)	<b>Fondante de Charneux</b>	<b>f09-11</b>	<b>3 à 4</b>	<b>3</b>
<b>Nouveau Poiteau</b> (B, 1843)		<b>10-02</b>	<b>6</b>	<b>3</b>
<b>Beurré Superfin</b> (F, 1844)		<b>m09-10</b>	<b>4 à 5</b>	<b>4</b>
<b>Clapp's Favourite</b> (US, 1860)		<b>f08</b>	<b>6</b>	<b>4</b>
<b>Louise Bonne d'Avranches</b> (F, 1778)		<b>f09-10</b>	<b>2 à 3</b>	<b>4</b>
<b>William's Duchess</b> (UK, 1841)		<b>f09-10</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Bruine Kriekpeer</b>		<b>8</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Doyenne du Comice</b> (F, 1849)		<b>d10-11</b>	<b>6 à 7</b>	<b>5</b>
<b>Durondeau</b> (B, 1811)		<b>f09-11</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Précoce de Trévoux</b> (F, 1862)		<b>m08</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
<b>Seigneur Esperen</b> (B, 1827)		<b>m09-10</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Triomphe de Vienne</b> (F, 1874)		<b>d09</b>	<b>4 à 5</b>	<b>5</b>
<b>Jeanne d'Arc</b> (F, 1893)		<b>d10-12</b>	<b>4 à 5</b>	<b>?</b>

Opmerkingen:

- 1) De ziekte kan op perenbomen plots optreden en in korte tijd de hele boom infecteren; men moet dus tijdens risicojaren waakzaam zijn voor de ontwikkeling van de ziekte vanaf het begin van de bloei (3 waarnemingen per week) en bijzonder waakzaam zijn voor de variëteiten geklasseerde onder 4 en 5.
- 2) Men moet er op toezien om de bomen in een centrale as te leiden, de bloemknoppen dicht bij de stam te verwijderen, alle bloemen van de tweede bloei (mei-juni) te verwijderen en vermijden van te hard snoeien wat leidt tot een wildgroei van takjes die duidelijk gevoeliger zijn voor infecties.